



## Esquema Nacional de Vacunación, Honduras

Vacuna	Edad de Aplicación/Esquema								
	RN	2 meses	4 meses	6 meses	12 meses	18 meses	4 años	11 años (Niños y Niñas)	11 años ( Niñas)
BCG <sub>1</sub>	1 dosis								
Hepatitis B pediátrica <sub>2</sub>	1 dosis								
Poliovirus Inactivada (VPI) <sub>3</sub>		1ra dosis							
Polio oral ( VOP/Sabin) <sub>4</sub>			2da dosis	3ra dosis		Refuerzo			
Rotavirus <sub>5</sub>		1ra dosis	2da dosis						
DPT-HepB-Hib (Pentavalente)		1ra dosis	2da dosis	3ra dosis					
Neumococo conjugada		1ra dosis	2da dosis	3ra dosis					
SRP <sub>6</sub>					1 dosis				
DPT						1er refuerzo	2do refuerzo		
Td								Refuerzo cada 10 años	
Virus del Papiloma Humano (VPH) <sub>7</sub>									2 dosis

- 1.- BCG: Administrar a recién nacidos con peso mayor o igual a 2,500 grs.
- 2.-Hepatitis B pediátrica: Administrar a recién nacidos no patológicos independiente del peso al nacer
- 3.- Poliovirus Inactivada (VPI): Administrar primera dosis a niños de 2 meses de edad
- 4.- Polio oral (VOP/Sabin): También se aplica cada 4 años en jornadas nacionales a población de 2 meses a 4 años, 11 meses, 29 días de edad, independiente de su estado vacunal.
- 5.-Rotavirus: Primera dosis aplicar entre 2 y 31/2 meses de edad y segunda dosis hasta menores de un año.
- 6.- SRP: También se aplica cada 4 años en campañas de seguimiento a población de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días de edad.
- 7.- Virus Papiloma Humano (VPH): 2 dosis: 1era, primer contacto, 2da, 6 meses después.



## Esquema Nacional de Vacunación, Honduras

Vacuna	Grupos en Riesgo/Esquema						
	2 meses	4 meses	6 meses	> 1 año	Embarazadas	Enfermos crónicos 2-59 años	Trabajadores de la Salud y otros grupos
Hepatitis B							3 dosis
Td <sub>9</sub>					3 dosis		
DT pediátrica <sub>9</sub>		2da dosis	3ra dosis				
Poliovirus Inactivada (VPI)	1ra dosis	2da dosis	3ra dosis				
Fiebre Amarilla				1 dosis			
Influenza <sub>10</sub>					1 dosis	1 dosis	1 dosis

8.- Td: Embarazadas con historia de vacunación inadecuada completar esquema.

Historia desconocida iniciar esquema de cinco dosis a completar en el post parto.

- Grupos en Riesgo esquema de 3 dosis y refuerzo cada 10 años

9.- DT pediátrica: Aplicarla a niños con reacción adversa severa al componente Pertussis de la vacuna combinada DPT-HepB-Hib (Pentavalente).

10.- Influenza: Dosis anual en población de 6 meses a 8 años y aplicar 2da dosis con intervalo de 1 mes después de la primera dosis, a quienes no han sido previamente vacunados. Trabajadores de la salud, trabajadores de granjas avícolas, embarazadas y adultos mayores de 60 años dosis única anual.